

Noviembre 24 de 2006 -

Cada día mueren en Colombia cinco personas a causa del sida

Aunque la epidemia se mantiene controlada, en el último año se reportaron 3.000 nuevos casos. El subregistro es alto: se cree que 171.000 personas están infectadas.

Otras ocho personas se enteraron de que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que provoca la enfermedad.

De acuerdo con Ricardo Luque, asesor de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, en el país hay reportados, con respecto al año pasado, 3.000 nuevos casos.

"Desde que la epidemia de sida empezó en Colombia (1983) a la fecha se han registrado 52.186 casos de VIH y sida; el 72 por ciento de ellos reciben tratamiento, lo que nos ubica en rangos similares a los de países desarrollados", dijo Diego Palacio, ministro de la Protección Social.

La cifra, según las propias autoridades de Salud, no refleja la situación real. Se estima que la prevalencia de la enfermedad entre colombianos de 15 a 49 años es del 0,7 por ciento, es decir que 171.504 personas son portadoras del VIH. No obstante, debido al diagnóstico tardío, al subregistro y a los retrasos en la notificación, solo hay reportados 52.186 casos.

El Ministro recordó que el test de Elisa, para detectar la presencia del virus en la sangre, hace parte de los planes obligatorios de salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado y consideró que es necesario hacer una labor educativa entre los afiliados al sistema para que la soliciten y accedan a ella a través de las EPS y las ARS.

Los análisis indican que la epidemia se mantiene estable; no obstante "nos preocupa la situación de regiones como la Costa Atlántica, Santander y el Eje Cafetero (en particular el Quindío), donde la prevalencia es mayor", dijo el Ministro Palacio, quien aseguró que el Estado invierte alrededor de 120.000 millones de pesos anuales en la atención de los enfermos de sida.

Para Sandro Calvani, presidente del Grupo Temático sobre Sida, todavía es posible considerar que la epidemia colombiana está concentrada en los llamados grupos vulnerables (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas endovenosas, entre otros). "No obstante, no podemos relajarnos. El virus entra cada vez que encuentra una puerta abierta. En su control deben involucrarse todos los actores de la sociedad, desde las autoridades hasta los ciudadanos", dijo Calvani.

De acuerdo con el informe Situación de la epidemia de sida, 2006, presentado esta semana por Onusida y la Organización Mundial de la Salud, aunque la epidemia se mantiene estable en algunas regiones (entre ellas América Latina), proporcionalmente se ha incrementado en el planeta.

En el último año hubo 4,3 millones de nuevos infectados (en total son 39,5 millones). La región más golpeada sigue siendo África subsahariana.

Tres etapas de la epidemia colombiana

1. Una trabajadora sexual de Cartagena fue el primer caso reportado de sida en Colombia (1983). El desconocimiento y la alta mortalidad generada por la falta de tratamiento dio inicio a una etapa de miedo hacia este mal, que incluyó la discriminación de la población homosexual.

2. A partir de la expedición de la ley 100, los pacientes han ido ganando acceso a los

tratamientos. En 1996, con la llegada de los antirretrovirales, se marcó un hito por el aumento de la supervivencia de estas personas. Sin embargo, persisten el estigma y la discriminación.

3. Se ha ganado en derechos, procedimientos y tratamientos, pero urge hacer prevención, pues la epidemia varía de una región a otra. Menos del 10 por ciento de la población vulnerable se beneficia con programas preventivos.

Un problema de salud pública, en cifras

Los más pequeños

Del total de casos reportados en Colombia, 1.446 corresponden a menores de 15 años. Es una cifra que preocupa, pues buena parte de los casos que hoy se diagnostican son de personas que se infectaron antes de los 20 años de edad.

En el embarazo

Según las estadísticas, 951 de todos los casos son de niños infectados por sus madres durante el embarazo o el parto. El Proyecto de Prevención de la Transmisión Madre Hijo hizo 371.425 pruebas a gestantes y detectó 845 mujeres y seis niños infectados.

Transfusiones peligrosas

Como consecuencia de transfusiones de sangre contaminada o el uso de elementos infectados durante estos procedimientos, en el país se han registrado 173 infecciones con VIH. Los bancos de sangre han extremado medidas para evitar nuevos casos.

Sin recursos del Fondo Global

Una propuesta con la que el país buscaba obtener 22 millones de euros (unos 65.000 millones de pesos) para ser invertidos, durante los próximos cuatro años, en la atención de grupos vulnerables, fue rechazada por el Fondo Global de Lucha contra el Sida.

El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, aseguró que si bien no se conocen las razones por las cuales la solicitud fue rechazada, el país apelará: "Aunque la no obtención de esos recursos no afecta los programas que están en marcha, iban a destinarse a actividades complementarias necesarias. Apelaremos, pero mientras tanto buscaremos recursos adicionales", dijo el ministro.

Sandro Calvani, presidente del Grupo Temático de Sida, aseguró que "se trata de una situación preocupante, porque afecta la intervención de grupos vulnerables. La experiencia ha mostrado que la forma de mantener la epidemia bajo control es prestarles la máxima atención".

Ricardo García, coordinador nacional de Onusida, explicó que buena parte de los recursos del Fondo se están girando a los países africanos en los que la epidemia es generalizada. Lamentó que no se aprobara la propuesta, "pues con la inversión y los esfuerzos adecuados, a diferencia de lo que ocurre en África, aquí podríamos ganarle la batalla a la epidemia".

ELTIEMPO.COM /

[Ver Términos y Condiciones.](#)

COPYRIGHT © 2006 CEET Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.